

## 安全駕駛寶典

⚠ 服用特定藥物(特別是3級紅色危險標示藥品)、酒精及毒品可能會引起嗜睡、眩暈、疲倦、專注力及判斷力降低、亢奮、反應遲緩或視力模糊等症狀。且特定藥物對駕駛能力的影響因人而異。

⚠ 如發現用藥後會降低駕駛能力,切勿駕駛。

⚠ 駕駛前應避免服用藥物。如無法避免,應要知道所服藥物對駕駛能力的影響。如有疑問可請教醫師或藥師,醫師評估後會選擇較安全藥物替代。

⚠ 應留意藥袋標示或藥物仿單、說明書上警語及注意事項,例如:「提醒病人可能有昏昏欲睡的危險,尤其是須要開車或操作機械的患者。」

⚠ 務必遵醫囑使用藥物治療疾病,隨時注意身體狀況,必要時請諮詢醫師及藥師。



臺北市衛生局  
臺北市立聯合醫院



誠摯關心您!



廣告

## 安全駕駛 最重「藥」

交通安全  
用藥分級宣導





# 影響交通安全藥物



**0級  
無風險**

不影響駕駛安全



**1級  
請小心**

駕駛前請仔細閱讀  
藥品說明書



藥物類別

症狀

降血壓藥物

頭暈、頭痛、視力模糊、倦怠、肌肉無力

止痛藥

頭昏眼花、疲勞

可待因(<20mg)

焦慮、神經質、易怒

止咳感冒藥

嗜睡、頭暈、手腳無力、注意力不集中



**2級  
應非常小心**

於駕駛需求前,應先  
尋求專業醫療評估



藥物類別

症狀

抗憂鬱藥

嗜睡、焦慮、激動、幻覺、意識模糊

麻醉劑

感覺及運動障礙

解痙藥

視覺調節和行為障礙

部分特定降血糖藥物

疲倦、冒冷汗、頭暈



**3級  
危險**

當服用此類藥品時勿駕駛車輛。  
於駕駛需求前,應先尋求  
專業醫療評估



藥物類別

症狀

部分特定抗精神病藥

嗜睡、視力模糊、頭痛、眩暈、噁心

安眠藥及Z-藥物

嗜睡

部分特定抗焦慮藥

嗜睡、困倦

散瞳劑

視力模糊、畏光

部分特定肌肉鬆弛劑

嗜睡、頭暈、手腳無力

### 如果我已經在服用藥物， 我該怎麼辦？

- 建議您誠實的與您的醫師討論，如果您沒有使用全部或任何醫師指示的藥物，也要誠實的告訴醫師。
- 尤其是如果您看不只一位醫師時，應提醒您的醫師您正在服用的其他藥物（包含處方藥和非處方藥），以及您正在使用的中草藥及營養補充品。
- 當您的醫師開立處方藥時，您應該詢問這些藥物的副作用及是否會影響駕駛。
- 您的醫師能夠調整您使用藥物劑量及時間，盡可能幫助您減少藥物的副作用。
- 不要隨意停止你所使用的藥物。

## 當我藥開車

### 同時服用多種藥物 會有那些影響？

- 某些人常在同一時間使用不只一種藥物，不同藥物的組合可能會帶來風險。
- 尤其是老年人需特別注意，因為隨著年齡的增長，身體會發生變化，他們使用比其他年齡層的人需要使用更多的藥物。
- 使用的藥物越多，藥物交互作用越多，藥物影響的風險更大。
- 避免上述這些問題，建議您一年至少一次與您的醫師討論，並讓藥師瞭解您所有使用的藥物（含處方藥和非處方藥）。也要讓您的醫師知道您正在使用哪些中草藥或營養補充品。

### 追蹤瞭解自己 用藥後的反應

- 瞭解您用藥後的感覺。例如：您感到睏倦嗎？視力模糊嗎？您是否感到虛弱、行動遲緩？什麼時候會發生？並記錄。
- 服用任何藥物或營養補充品，應追蹤瞭解其對您身體的反應。
- 開始使用任何一種新的藥物，一定要知道有關該藥副作用的訊息。

### 讓醫師和藥師 知道您用藥後的反應

- 無論您對使用處方藥和非處方藥的反應如何？不論好或壞請告訴您的醫師或藥師。
- 每個人都是獨一無二的個體，使用同一種藥物都可能有不同的反應。
- 如果您出現藥物副作用，請讓您的醫師知道，您的醫師可以協助您調整藥物。

### 您可詢問醫師 是否可繼續開車？

- 建議您剛開始使用新藥物時，請勿駕駛。直到您知道該藥物可能對您的影響。
- 過度使用非處方藥物和中草藥、營養補充品可能也會影響駕駛安全。
- 有任何疑慮可詢問醫師。

### 如果醫師告訴我必須減少 或停止駕駛，該怎麼辦？

- 您還是可以提前規劃行程，可考慮與家人和朋友一同開車；或搭乘公共運輸工具，例如：計程車、公共巴士、火車和捷運或步行。



## 哪些藥物可能會影響我的駕駛能力？

包括：

- 過敏
- 焦慮
- 憂鬱症
- 糖尿病
- 心臟病和高血脂
- 高血壓
- 肌肉痙攣
- 疼痛
- 帕金森氏症
- 思覺失調症

## 用藥物後可能引起哪些反應，造成駕駛風險？

這些反應可能包括：

- 睏倦
- 視力模糊
- 頭暈
- 動作遲緩
- 暈倒
- 無法集中注意力
- 噁心



臺北市府衛生局  
臺北市立聯合醫院



誠摯關心您！



建議使用所有藥物前，若有任何不清楚應諮詢專業醫師或藥師，評估其安全性



# 安全駕駛 最重藥

上路之前藥知情  
安心出發平安行





# 不藥駕、不毒駕、不酒駕



# 行車安全不下架

服用特定藥物、酒精及毒品可能會引起嗜睡、眩暈、疲倦、專注力及判斷力降低、亢奮、反應遲緩或視力模糊等症狀。特定藥物對駕駛能力的影響因人而異。應留意藥袋標示上警語，隨時注意身體狀況，必要時請諮詢醫師及藥師。



臺北市衛生局  
臺北市立聯合醫院



誠摯關心您！

廣告